

BRA ATT VETA



ORDLISTA

Air-Pot® - Ett odlingssystem som säkerställer att växterna har ett välutvecklat rotsystem och att de är i god kondition. Odlingen sker ovan jord där trärötter och substrat är omgiven av perforerad plastvägg. Systemet förhindrar rotsnurr och ger ett välförgrenat rotsystem utan att skada finrötter. Hela rotsystemet är således intakt vid leverans. Odling i Air-Pot® möjliggör företablering av växter och ger mycket större flexibilitet gällande planteringstid. Vid leverans skyddas trädklumpen av väv och nät för att klara hantering. Detta öppnas upp och viks ner vid plantering.

Apomiktisk - Betyder att en art kan sätta frö utan föregående befruktning. Det medför också att fröavkomman blir mycket enhetlig, näst intill identisk med moderplantan. Flera arter inom släktet *Sorbus* är apomiktiska.

Bördighet - Bördighet brukar man främst tala om hos fruktträd. Det handlar om sortens fruktsättning. Med tidig och rik bördighet menas att trädet sätter frukt redan i unga år och att skördarna blir stora.

Etableringsbeskärning - Små marktäckande buskar såsom *Salix repens* 'Green Carpet' kan behöva beskäras vid planteringen för att grena sig ordentligt. För träd handlar etableringsbeskärningen främst om att ta bort dubbeltoppar, felväxande och skadade grenar. Större ingrepp som inte är akuta bör man vänta med tills trädet är etablerat, ca 1 år efter planteringen.

Habitus - Betyder egentligen form och beskriver växtens växtsätt, exempelvis hängande, pelarlikt eller rundat.

Klon/Sort - En växt som är identisk med dess moderplanta. Förökningen sker genom sticklingar, ympning, okulering eller mikroförökning. Fördelen med en klonad växt jämfört med en fröförökad är att man med säkerhet vet vilken form, blom- eller bladfärg, frukt mm som växten får.

Kloros - Kloros inträffar ofta vid höga pH-värden då växterna hindras att ta upp järn och mangan. Detta yttrar sig som gulmarmorade blad. Vissa växter är känsligare än andra. Många surjordsväxter drabbas av kloros på alltför kalkrika jordar.

Lenticeller - Kallas barkens andningshål. Hos vissa släkten, t ex *Prunus*, är de mycket tydliga och ibland även utstående.

Pionjär - Ljuskrävande arter som är snabbväxande och de första att kolonisera nya landområden. De har även snabbväxande rötter som ibland kan ställa till med besvär. Träd som tillhör denna grupp, t ex björk, blir oftast inte särskilt gamla.

Proveniens/frökälla (Fk) - En bestämd population från vilken frö samlas, oftast angiven efter geografiskt namn. En frökälla kan vara både naturlig (ett bestånd) eller planterad i en frötäkt eller fröplantage. Den genetiska koden finns kvar i fröna oavsett var växten odlas. På våra breddgrader är det av stor betydelse att man väljer en frökälla som är klimatanpassad och hinner avmogna i god tid på hösten

och inte riskerar att slå ut för tidigt på våren. Fröförökad al, björk och hassel är exempel på arter där man bör vara extra noggrann med valet av proveniens/frökälla.

RCC - Root Control Container är en nyutvecklad kruka för att förhindra rotsnurr i produktion av träd och solitärbuskar. Krukan är perforerad vilket gör att trärötterna blir luftpincerade. På så sätt minskas risken för rotsnurr radikalt och trädet får ett mer välförgrenat rotsystem. En utmärkt produkt för att kunna leverera träd av högsta kvalitet oavsett årstid. Vi avlägsnar krukan inför leverans för att kunna återanvända den, varför rotklumpen levereras emballerad i juteväv. Vi erbjuder träd i RCC i främst storlekarna 12-14-16-18. När det gäller större storlekar föreskriver vi Air-Pot®.

Rotsnurr - Rotsnurr kallas det när rötterna på krukodlade träd och buskar börjar växa längs krukväggarna. Även om plantan planteras ut fortsätter rötterna att växa runt, vilket ger ett instabilt rotsystem. Det är mycket viktigt att snitta upp rötterna på 3-4 ställen för att bryta snurren och stimulera ny rottillväxt. I allvarliga fall (tjocka förvedade snurrötter) bör plantan reklameras.

Sekundär - Sekundärerna, eller klimaxarterna är de arter som utgör slutskeden i en succession. De är i många fall långsamväxande som unga och kräver skydd och jämna växtbetingelser i unga år. De är vanligtvis mycket skuggtåliga som unga och får i naturen skydd av andra uppvuxna växter under de känsliga unga åren. Som äldre tål de väder och vind bättre och konkurrerar därmed ut pionjärer för att sedan utgöra klimaxsamhället i ett skogssystem. Exempel på sekundära arter är *Fagus sylvatica*, *Picea abies* och *Abies nordmanniana*.

Semipionjär - En något diffus uppdelning av växter som varken likt pionjärerna är först på plats eller som sekundärerna dominerar ett klimaxsamhälle i successionens sista skede. Semipionjärerna kräver generellt friskare och mer näringsrika jordar jämfört med många pionjärer men klarar en del skugga som unga. De behöver dock inte ammas i samma utsträckning som sekundärerna. Som äldre blir de dock mer ljuskrävande och kan skuggas ut om ljusförhållandena är för dåliga. Semipionjärerna uppträder ofta som brynväxter eller som "luckpionjärer" efter att en mindre störning skett i ett skogssystem. Exempel på semipionjära arter är *Acer campestre*, *Prunus avium* och *Prunus padus*.

Ståndort - Ståndort är synonymt med växtplats och innefattar en växts krav på jord, vatten, näring och ljus. Till ståndorten räknas även konkurrens med andra växter och mikroklimat.

Ståndortsamplitud - Anger växtens möjliga växtplatser, t ex sandiga till leriga jordar, sol-halvskugga och fuktiga till våta jordar.

Ursprung - Det område från vilket växten ursprungligen härstammar från.

FRAKT OCH EMBALLAGE

FRAKT

Vi jobbar nära vårt fraktbolag som håller hög service och vana vid växtleveranser. För att ta reda på just ert fraktpreis eller avtal kontakta din kundansvarig. Fraktpriset är exklusive lossning.

Frakt gäller för leverans där framkomlighet är möjlig med av Stångby utsedd lastbil och släp. Information om eventuella begränsningar gällande vikt eller höjd som hindrar framkomlighet lämnas innan offert. Specialtransport offereras separat eller enligt fraktfaktura och skall framgå i offerten, annars gäller leverans till närmast tillgängliga plats och kund får själv ombesörja transport till arbetsplatsen.

För att frakta växterna på ett säkert sätt, skydda växterna och lasta effektivt använder vi oss av olika typer av emballage. Här under kan ni läsa om de olika emballagen som används, vad de används till samt vad som gäller för respektive emballage:

PLASTBACK

Används främst till perenner. Full avgift debiteras, vid återlämning av backar återbetalas halva värdet.

TRÄLÅDA

Används framför allt till buskar. Debiteras till självkostnadspris.

PALLBOTTEN/EUROPAPALL

Används bland annat till mindre solitärer (sol), perenner och ungträd (Utr). Debiteras till självkostnadspris.

TRÄD OCH STÖRRE SOLITÄRER

Lastas löst och skyddas av jutesäckar. Ett metallnät håller ihop klumpen och kronorna binds in i den mån det är möjligt. Inbindningen av kronan görs med snöre och kallas tränsning.

CC-VAGN

Används främst för inleverans till plantskolan. I undantagsfall levereras de ut till kund men då endast vid leverans av perenner och buskar som EJ kan levereras liggande i pall. Det är viktigt att alla CC-vagnar går i retur/hämtas av oss och att de då är kompletta med rätt antal hyllor.

RETURER

Vårt producentansvar innebär att vi tar emot allt emballage som plastlådor, pallar och CC-vagnar etcetera som lämnas in till oss i retur. Vi hämtar returmaterial fraktfritt utom i de fall där det inte är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart, men ni är självklart välkomna att själva lämna in det till oss. Material som går i retur skall vara rent från allt innehåll som till exempel jord, stenar och dylikt.

AVFALL

Vi använder oss av emballage som är återanvändningsbart och som gärna får användas i kundens fortsatta arbete.

För att uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska alla som bygger eller anlägger sortera det avfall som skapas. Återvinning ska ske av sådant som kan återanvändas och sortering av bygg- och anläggningsavfall ska ske på plats för att på så vis minska nedsmutsning. Om medföljt emballage inte längre ska nyttjas ska det hanteras som avfall och sorteras efter avfallsslag: plast samt trä. Inget trä är behandlat.



Läs gärna mer under fliken Råd & Tips på vår hemsida. Där hittar du information om bland annat; växtmottagning, växtbäddar, plantering och etableringsskötsel.



STORLEKS- OCH VIKTTABELL

För att underlätta hantering och plantering av våra träd listar vi här riktvärden för storlek och vikt. Vikten varierar något beroende på artens beskaffenhet och mängden fukt i rotklumpen.

I vissa fall kan en rotklump med specifika mått önskas för att bättre passa till ditt projekt. Vi kan i många fall skräddarsy denna efter dina önskemål. Detta förutsätter dock att beställning görs i god tid.

Kontakta oss gärna för vidare diskussion.

Trädets omkrets (cm)	Klump/Air-Pot		
	Ø (cm)	Höjd (cm)	Vikt (kg)
12-14	50/60	35/35	140/180
14-16	50/60	35/35	140/180
16-18	60/70	40/40	170/200
18-20	60/70	45/45	200/240
20-25	80/90	45/45	300/320
25-30	90/100	50/50	350/400
30-35	100/110	50/50	700/800
35-40	110/120	60/60	800/900
40-45	120/140	60/60	1000/1300
45-50	120/140	80/80	1800/2 000
50-60	157/170	80/80	3 500/4 000
60-70	180/200	90/90	4 500/5 000
70-80	200/220	90/90	5 500/6 000
80-100	220/240	100/100	7 500/8 000


HÄRDIGHET

Härdigheten ger en uppfattning om en växts möjliga utbredning, men zonerna är inte fasta och det finns stora variationer inom varje geografisk odlingszon. Det beror bl.a. på jordens beskaffenhet. En väl-dränerad jord gör zonen lägre, medan tung, kompakterad och kall jord kan höja zonen. I våra tätorter med mycket värmelagrande stenmaterial och läckande värme från omgivande infrastruktur kan zonen vara både en till två zoner lägre än vad som anges på zonkartan.

Du kan själv påverka zonen genom att t.ex. plantera i upphöjda bäddar som värms upp snabbare på våren och blir mer dränerade än omgivande mark. Häckar och buskage hjälper till att förbättra zonen genom att de skapar lä.

Exotiska växter som egentligen inte klarar av zonen den befinner sig i klarar ofta av att planteras i stadens centrala delar där det är ett helt annat mikroklimat. Bygg dock stommen med ordentligt härdiga träd och buskar. Att plantera en allé med ett träd som är precis på sin nordgräns är vanskligt då det stör helhetsintrycket mycket om ett av träden inte skulle klara sig. Lägg gärna till en odlingszon på dina stomväxter för att vara säkra på att de klarar av de riktigt kalla vintrar som förr eller senare dyker upp. Det samma gäller häck som ska vara ett stabilt inslag i en anläggning och där är det svårt att på ett snyggt sätt ersätta delar av en häck som dött i efterhand.

Svensk Trädgårds Zonkarta över Sverige



INVASIVA FRÄMMANDE VÄXTARTER

För att skydda vår inhemska flora är det viktigt att vi inom den gröna branschen blir mer medvetna om främmande växtarter med invasivt beteende. Dessa arter kan sprida sig snabbt och skapa omfattande störningar i vår svenska natur.

Främmande art

Främmande arter har med människans hjälp förflyttats till ett område där de inte funnits tidigare, exempelvis genom växtimport. Växter som har introducerats och etablerats i Sverige före 1800-talets början räknas inte som främmande utan betraktas som inhemska.

Invasiv främmande art

När främmande arter blir invasiva i sin nya miljö klassas de som invasiva främmande arter. Det innebär att de etablerar sig, sprider sig kraftigt och orsakar skador på naturen, människors hälsa eller ekonomin.

EU:s förteckning över invasiva främmande arter innehåller växter som är förbjudna enligt lag att importera, sälja, byta, odla, transportera, använda och hålla levande exemplar av. Det finns också främmande arter som är eller riskerar att bli invasiva i Sverige, men som inte omfattas av några regler. Dessa finns samlade på SLU Artdatabankens risklista.



Se EU:s förteckning över samtliga invasiva främmande arter.

SLU Artdatabankens risklista

I arbetet med att begränsa spridningen av invasiva främmande arter har SLU Artdatabanken tagit fram risklistor där de främmande arternas spridningsbenägenhet klassificeras. De främmande växter som ingår i Artdatabankens risklista har potential, att redan nu eller inom 50 år, sprida sig på ett sätt som missgynnar de inhemska arterna i deras biotoper och hotar den biologiska mångfalden. De kan också ibland hybridisera med inhemska

arter, eller riskera att ha med sig sjukdomar och andra organismer som kan göra skada i de inhemska biotoperna (t.ex. askkottssjukan och lövplattmasken).

När Artdatabanken klassificerar de främmande växterna värderar de dels spridningsrisken, dels på hur stor skada de potentiellt kan ställa till med. I det arbetet räknar man med en viss förskjutning i klimatet. Till exempel räknar man med att Götaland som idag har ungefär 250-300 dagar lång vegetationsperiod per år, inom 50 år kommer att ha 300-350 dagar lång vegetationsperiod vilket kan ha stor betydelse för vilka arter som kan sprida sig på nya platser.



Se samtliga riskklassificerade växter i SLU Artdatabankens risklista.

Hur ska vi förhålla oss till risklistan?

För att skydda den svenska naturen är det viktigt att vi alla bidrar till att begränsa spridningen av invasiva främmande växter. Vid naturnära planteringar, särskilt i närheten av skog eller ängsmarker, bör de riskklassificerade växterna undvikas eftersom de kan sprida sig och konkurrera med den inhemska floran.

Spridningsbenägna växter kan däremot användas i avgränsade miljöer där de inte riskerar att missgynna vår naturliga flora. Dessa växter har en förmåga att överleva utsatta lägen och hårt slitage. Det är dock viktigt att komma ihåg att vissa växter sprider sig genom djur, exempelvis fåglar som äter bär och sprider frön till nya platser. Sådan spridning kan vi inte stoppa.



Symphoricarpos albus, snöbär och *Symphoricarpos x chenaultii*, hybridsnöbär klassades 2024 som "Mycket hög risk" respektive "Hög risk" enligt SLU Artdatabankens risklista. Det innebär inte att den är förbjuden att plantera, men att växtplatsen bör noga övervägas.

E-PLANTA

E-planta är ett varumärke och en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter utvalda för svenskt klimat. Sortimentet består av träd, buskar, häck-, kläng- och barrväxter samt certifierade frukt- och bärsorter. Varumärket E-planta ägs av Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS).

E-plantsystemet

E-plantsystemet är ett samarbete mellan svenska plantskolor, EPS, SLU Sveriges lantbruksuniversitet och växtanvändare i offentlig verksamhet och fritidsodling. Systemet startades 1990 för att tillgodose behovet av ett klimatanpassat växtmaterial som utvecklas bra i vårt, många gånger tuffa, svenska klimat.

Systemet omfattar framtagning, provodling, produktion och marknadsföring av växtmaterial utvalt för svenskt klimat. Målsättningen är att samla de bästa växterna under gemensam beteckning, kvalitetssäkra dess produktion samt täcka växtanvändarnas behov.

EPS bevarar sjukdomstestade kärnplantor till alla vegetativt förökade E-plantor. Till fröförökade E-plantor plockas frö enbart på utvalda frökällor.

Urval av E-plantor

E-plantor väljs ut av en expertgrupp vid EPS. Gruppen har bred kompetens med representanter från forskning/försök, EPS, plantskolor, offentliga växtanvändare och fritidsodling.

Höga krav på art- och sortäktighet, sundhet och odlingsvärde ligger till grund för E-märkningen. Odlingsvärdet fastställs genom provodling på flera platser i landet. Detta ger säkra underlag till korrekta zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.



Vill du läsa mer hur chipmärkning går till hos oss?
Scanna QR koden eller besök vår hemsida
<https://stangby.nu/e-planta/>

Produktion av E-plantor

För att skapa långsiktiga resurser till produktutveckling och marknadsföring av E-plantor har landets ledande produktionsplantskolor bildat E-planta ekonomisk förening. Det är endast medlemmar som får producera E-plantor och de följer strikta produktionsregler. Produktionen kontrolleras av Jordbruksverket.

Dokumentation, märkning, chip och certifikat

E-plantornas härkomst är väl dokumenterad och vid försäljning i partiskriver producenten ut ett nummerat E-certifikat som garanterar ursprung. Alla E-märkta träd med stamomfång 10-12 cm och uppåt förses dessutom med ett chip som ytterligare förbättrar spårbarheten. Med en scanner kan chipnummer och sort avläsas vid en besiktning. E-plantor märks med stort E efter art-/sortnamn och oftast finns E-logotypen tryckt på etiketten.

Vid leverans och vid slutbesiktningar av anläggningar bör besiktningsmannen kontrollera att det medföljer E-plantcertifikat på de E-plantor som levererats.

Utvecklingsarbete

Kontinuerligt arbete pågår för att förbättra plantskolesortimentet. Flertalet av E-plantorna är framtagna i olika projekt vid SLU. Ett samarbete med Norges motsvarande E-plantsystem har medfört att även växter utprovade i Norge kan E-märkas. Dessa växter dokumenteras och utvärderas i Sverige innan de E-märks.

Mer om E-plantor

På E-plantas hemsida www.eplanta.se finns mer information om E-plantsystemet samt utförliga växtbeskrivningar och bilder på växter med E-märkning.



GRÖNT KULTURARV

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, POM. POM är ett nationellt program för att långsiktigt bevara den genetiska mångfalden bland våra kulturväxter och deras vilda släktingar.

Idag är många sorter av våra traditionella växter hotade och därför har inventerat och samlat in det mest intressanta och värdefulla av vad som växer i vårt land. Växterna kommer att bevaras för framtiden i den svenska nationella genbanken. Syftet är att tillhandahålla ett sortiment som görs tillgängligt för alla, för dem som vill odla, forska eller bara njuta av växternas variation.

Sorterna har odlats i Sverige sedan 1940-, 1950- eller 1960-tal, beroende på växtslag. Alla bär på en historia och i flera fall finns det traditioner, berättelser och lokala namn knutna till dem. De har inspirerat till de nya sortnamn som växterna har fått. För att en växtsort ska kunna saluföras under Grönt kulturarv® krävs att den ska finnas i den nationella genbanken.

Programmet startade 2000 och ingår i miljö kvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. POM samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår, till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, Fritids Odlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

POM:s arbetsområden omfattar:

- inventering och insamling av växter, beskrivning av dem samt olika former av bevarande
- ökad användning av kulturväxterna genom odling, växtförädling och andra former av nyttjande
- forskning om arternas släktskap och genetiska variation, om utveckling av nya grödor samt om hur växterna bäst bevaras för framtiden
- utbildning och information
- internationellt samarbete
- uppbyggnad av en svensk nationell genbank



GRÖNT KULTURARV



Aster amellus 'Axel Tallner' - brittsommaraster Foto: POM



Anemone tomentosa 'Föräldrahemmet' - silvrig höstanemon



Humulus lupulus 'Svalövs S' - humle Foto: Erik De Vahl



Betula pendula 'Dalecarlica' - ornäsbjörk Foto: Hendrik Morin

FÖRTYDLIGANDE - KVALITETSANGIVELSER

Saknar
trädet du valt en
premiumsymbol?
- Ingen fara,
kontakta oss så skapar vi
skräddarsydda lösningar
till ditt projekt!

Zonen anger växtens vinterhärdighet och utgår från Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta som du hittar under avsnitt Bra att veta. Zonangivelserna skrivs med romerska siffror och siffror inom parentes anger att växten kan klara även den zonen om läget är skyddat.

Höjd och bredd ger dig en ungefärlig uppfattning av växtens slutstorlek. För pelarformiga träd som länge håller sig smala men sedan breddas rejält har vi inte angivit slutstorleken. Kom ihåg att dessa uppgifter är ungefärliga och kan variera stort beroende på jord, läge och zon.

 Stångby Premium är en selektion av våra egenodlade träd. Kontakta din kundansvarig för mer info om tillgång och storlekar. Läs mer om Premium under avsnitt Om Stångby.

 E-planta, läs mer under avsnitt Bra att veta

 Grönt Kulturarv, läs mer under avsnitt Bra att veta

- spicata FK FALUN E, häggmispe

Zon I-VII. Höjd 3-5 (-7) m, bredd 1,2-2 (-3) m. Tät smalvuxen buske med upprätt växtsätt. Grått bladutslag i samband med blomning. Höstfärger i gult. Sprider sig sakta utåt med rotskott och kan bli bredare än angiven bredd, vilket är viktigt att ta i beaktning. Mycket hårdig och anspråkslös vad gäller jordkrav. Bra häckväxt till smala friväxande häckar. E-typen är mer enhetlig än arten och har god härdighet med svensk proveniens från Falun.



Häck barrot	30-50
Häck barrot	50-80
Busk C 3,5 I	
Sol C/K	100-125
Sol 3x K	125-150
Sol 3x K	150-175
Sol 3x K	175-200
Sol 3x K	200-250

Här hittar du vetenskapligt och svenskt namn på växten samt en kortfattad beskrivning av växten och dess krav på växtplats, användningsområden och annan information som kan vara till nytta. Sist i stycket hittar du ibland *Ursprung* vilket syftar till området där växten ursprungligen härstammar från.

Utseende på växten vid leverans. *Häckplantor* är normalt mellan 1-3 år beroende på art/sort och med svagt utvecklade sidogrenar. *Busk* är generellt en kraftigare planta än häck med fler utvecklade sidogrenar och ett mer utvecklat rotsystem, oftast 1 till ett par år äldre. *Solitär* innebär att växten har utvecklade sidogrenar från basen. *Flerstam* är en större välförgrenad solitär, benämningen används endast för träddarter. *Högstam* innebär att trädet är uppstammat och har en genomgående stam upp till kronan. Utöver de visade kvalitéerna kan även förkortningen *sh* komma ifråga. *Sh* anger stamhöjd, t.ex. 90-110 (cm). Oftast på små prydnadsträd med toppympad krona. *Stambusk* är ej uppstammat träd med genomgående stam, där den nedersta grenvåningen är högst 80 cm över marken.

Anger hur många gånger växten är omplanterad och om växten är klumpad (K), krukodlad (C) eller barrotad. Är växten barrotad skrivs detta i regel inte ut, men vi har valt att förtydliga detta genom att skriva ut "barrot".

I den här kolumnen anges växtens storlek, ex 30-50 för häckplantor, som betyder att topphöjden är mellan 30 och 50 cm vid leveranstillfället. För barrotade buskar anges topphöjden, för buskar i kruka anges krukstorleken. För solitärbuskar, flerstamsträd och ungträd anges topphöjden i centimeter. För stamträd (ex högstamsträd) anges stammens omkrets mätt i centimeter (1 m upp på stammen). För stambuskträd anges topphöjden i centimeter eller stammens omkrets mätt i centimeter (1 m upp på stammen).

Förklaring av förökningssätt, ålder och omplanteringar av häck- och landskapsväxter

2/0	2-årig fröplanta, ej omskolad
1/1	2-årig fröplanta, omskolad efter ett år
1/2	3-årig fröplanta, omskolad efter ett år
2/2	4-årig fröplanta, omskolad efter två år
0/1	1-årig sticklingsförökad planta
0/2	2-årig sticklingsförökad planta, ej omskolad.
0/1/1	2-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år
0/1/2	3-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år



Vill du läsa mer om Kvalitetsregler för plantskoleväxter?
Scanna QR koden eller besök vår hemsida
www.stangby.nu/kvalitetsregler-plantskolor

Omvandlingstabeller

Planteringsavstånd

c/c avstånd	Plantor/m ²
10	100
15	44
20	25
25	16
30	11
35	8
40	6
50	4
60	3
70	2
80	1,5
90	1,2
100	1
120	0,7
150	0,44
200	0,25

Hur tjock är stammen?

Omkrets (cm)	Diameter (cm)
8-10	2,5-3,2
10-12	3,2-3,8
12-14	3,8-4,5
14-16	4,5-5,1
16-18	5,1-5,7
18-20	5,7-6,4
20-25	6,4-8,0
25-30	8,0-9,5
30-35	9,5-11,1
35-40	11,1-12,7